INSTRUCTIONS
READ BEFORE USE

Ultima's™

Kokron
Super Gel

Fipronil 0.05% Gel
(Household Insecticide)

Manufactured By:
Ultima Search
51-B, Phase-I, GIDC, Vapi,
Gujarat - 396195

Kokron Supergel
Fipronil 0.05% Gel (Household Insecticide)

Fipronol 0.05 % Gel is a household insecticide recommended for the control of of American cockroach (Periplaneta americana) and German cockroach (Blattella germanica). Extremely low amounts of the chemical is required to achieve the control. The application of gel is fast and convenient, as it causes no disturbance or discomfort and there is no need to leave the premises during or after the treatments. It is highly effective, safe and the most modern technology for cockroach control.

Direction Of Use - The Gel system is compact and easy to use. The cartridge containing the insecticide is to be fitted to the specially designed bait gun, which facilitates precision dosing and at every shot 0.03 gm of Fipronil Gel is released. It is important to identify the cockroach species because this influence the spot size of the Gel. For smaller sized German Cockroach, spot size of 3- 4 mm in diameter is ideal and for the larger American cockroaches the spot size should be 6 mm in diameter. The difference in spot size is necessary to account for greater consumption of the gel by larger cockroaches. Knowing the level of cockroach infestation is very important because it influences the number of spots to be applied in cracks & crevices and other common cockroach harborages. For a good control 3 to 4 spots per sq. mtr is recommended. The area to be treated should be calculated on the basis of surface area of the site being treated and not on the basis of floor area.

Precautions - Keep away from food stuff. Do not smoke, eat or drink while using. Wash off contaminated body/clothes after use and before eating, drinking.

Symptoms Of Poisoning - Mainly consists of irritability lethargy, muscle tremors and in extreme cases possibly convulsions may occur. Fipronil is a reversible GABA receptor inhibitor and these symptoms are reversible after termination of exposure.

First Aid - Induce vomiting if swallowed by tickling at the back of the throat with the finger. Flush the eyes with plenty of cold water. Wash the skin with plenty of soap and water. Get medical attention.

Antidote - No specific antidote. Give symptomatic treatment.

Disposal Of Used Container - Destroy empty cartridges by crushing and burying in soil in a safe place away from water sources and habotants. Used cartridges should be destroyed in such a manner so that there will be no water or environmental pollution. Used cartridges should not be left outside to prevent its reuse.

Storage Conditions - The Cartridge containing the Formulated grade insecticides should be stored in original container in a separate room or almirah under lock and key depending on the upon the quantity of pesticide, away from reach of children, food stuffs, animal feeds and other articles and keep in cool and dry place. The premises for storage should be well built, well lit, sufficient in dimension and well ventilated.

Chemical Composition - Fipronil A. I. - 0.05 % m/m ; Monobutyl ether of diethylene glycol - 0.50 % m/m, Denatonium benzoate - 0.005 % m/m; Moisture content - 17.00 % m/m ; Fructose - QS % to 100 %

Manufactured By - M/s Ultima Search, PLOT NO 51-B, GIDC, PHASE-1,VAPI-396195, DISTT-VALSAD

.फिप्रोनिल **0.05%** जेल
(घरेलू कीटनाशक)

अमेरिकी कॉकरोच (पेरिप्लानेटा अमेरिकाना) और जर्मन कॉकरोच (ब्लेटेला जर्मेनिका) के नियंत्रण के लिए फिप्रोनोल 0.05% जेलिसा घरेलू कीटनाशक को सुझाव दिया जाता है। नियंत्रण प्राप्त करने के लिए रसायन की बेहद कम मात्रा की आवश्यकता होती है। जेल का उपयोग तेज़ और सुविधाजनक है, क्योंकि इससे कोई परेशानी या असुविधा नहीं होती है, और उपचार के दौरान या बाद में परिसर छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यह कॉकरोच नियंत्रण के लिए अत्यधिक प्रभावी, सुरक्षित और सबसे आधुनिक प्रौद्योगिकी है।

उपयोग करने की विधि - जेल प्रणाली संक्षिप्त और उपयोग में सरल है। कीटनाशक युक्त कार्ट्रिज को विशेष रूप से डिज़ाइन की गई बैट बंदूक में फिट किया जाता है, जो सटीक खुराक की सुविधा प्रदान करता है और प्रत्येक शॉट पर 0.03 ग्राम फिप्रोनिल जेल निकलता है। कॉकरोच की प्रजाति की पहचान करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जेल के स्पॉट के आकार को प्रभावित करता है। छोटे आकार के जर्मन कॉकरोच के लिए, ३-४ मिमी व्यास का स्पॉट आकार आदर्श है और बड़े अमेरिकी कॉकरोच के लिए, स्पॉट का आकार ६ मिमी व्यास होना चाहिए। बड़े कॉकरोचों द्वारा जेल की अधिक खपत के लिए स्पॉट आकार में अंतर आवश्यक है। कॉकरोच संक्रमण के स्तर को जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दरारों और छिद्रों में और अन्य सामान्य कॉकरोच आश्रयों में लगाए जाने वाले स्पॉट्स की संख्या को प्रभावित करता है। अच्छे नियंत्रण के लिए प्रति वर्ग मीटर ३ से ४ स्पॉट्स की सिफारिश की जाती है। उपचारित किए जाने वाले क्षेत्र की गणना उपचारित स्थल के सतह क्षेत्र के आधार पर की जानी चाहिए न कि फ्लोर क्षेत्र के आधार पर।

सावधानियां - खाने-पीने की चीजों से दूर रखे। इस्तेमाल करते समय धूम्रपान न करें, शराब न पिएं और ना ही कुछ खाए। इस्तेमाल के बाद और खाने-पीने से पहले दूषित शरीर/कपड़े को धो लें।

जहर के लक्षण - मुख्य रूप से इसमें चिड़चिड़ापन, सुस्ती, मांसपेशियों की कंपन और बहुत अधिक मामलों में ऐठन हो सकती है। फिप्रोनिलिस प्रतिवर्ती GABA रिसेप्टर अवरोधक है और ये लक्षण एक्सपोजर की समाप्ति के बाद प्रतिवर्ती होते है।

प्राथमिक चिकित्सा - निगलने पर गले के पीछे उंगली से गुदगुदी करके उल्टी करने के लिए प्रेरित करें। आंखों को खूब ठंडे पानी से धोएं। त्वचा को ढेर सारे साबुन और पानी से धोएं। चिकित्सकीय सहायता लें।

एंटीडोट - कोई विशिष्ट एंटीडोट नहीं। लक्षण के अनुसार उपचार दें।

इस्तेमाल किये गए कंटेनर का निपटान - खाली कार्ट्रिज को कुचलकर और पानी के स्रोतों और अपशिष्ट पदार्थों से दूर किसी सुरक्षित स्थान पर मिट्टी में गाड़कर नष्ट कर देना चाहिए। इस्तेमाल की गई कार्ट्रिज को इस प्रकार नष्ट किया जाना चाहिए ताकि जल या पर्यावरण प्रदूषण न हो। उपयोग किए गए कार्ट्रिज को दोबारा उपयोग से बचाने के लिए बाहर नहीं छोडना चाहिए।

संग्रहण शर्तें - फॉर्म्यूलेटेड ग्रेड कीटनाशकों के कार्ट्रिज को मूल कंटेनर में एक अलग कमरे में कीटनाशक की मात्रा के आधार पर ताला लगाकर, बच्चों, खाद्य सामग्री, पशु आहार और अन्य वस्तुओं की पहुंच से दूर संग्रहित किया जाना चाहिए और एक ठंडे स्थान और सूखी जगह पर रखा जाना चाहिए। भंडारण के लिए परिसर अच्छी तरह से बना हुआ, अच्छी रोशनी वाला, पर्याप्त आयाम वाला और अच्छी तरह हवादार होना चाहिए।

रासायनिक संरचना - फिप्रोनिल ए.आई. - 0.05 % m/m, डायथिलीन ग्लाइकॉल का मोनोब्यूटाइल ईथर - 0.50 % m/m, डेनाटोनियम बेंजोएट - 0.005 % m/m, नमी की मात्रा - 17.00 % m/m, फ्रूक्टोज - QS % m/m.

द्वारा निर्मित - अल्टिमा सर्च, प्लॉट नंबर 51-बी, जीआईडीसी, फेज-1, वापी - 396195, जिला-वलसाड

Kokron (ककरोन) सुपारजेल
Fipronil (फिप्रोनिल) ***0.05%*** जेल
(वाड़ि़र भेतर व्यवहार करार कीटनाश्क)

Fipronil (फिप्रोनिल) *0.05 %* जेल वाड़ितें व्यवहार करार कीटनाश्क, या आमेरिकान आरशोला (पेरिप्लानेटा ऍामेरिकानना) ও जार्मान आरशोला (ब्लाटेला जारमानिका) नियन्त्रणेर क्षेत्रे खुवई उपयोगी। आरशोला नियन्त्रणेर जन्य एई रासायनिकेर अति सामान्य परिमाणও वेश कार्यकरी। एई जेलटि द्रुत सुविधाजनक उपायेय व्यवहार करा याय, आर एटा प्रयोग करार पर कोनও असुविधा वा अवज्ञि हय ना, तांई प्रयोगेर समय वा प्रयोगेर पर स्थान त्याग करारও प्रयोजन हय ना। एटा आरशोला नियन्त्रणेर एक कार्यकरी, निरापद ও सर्वाधुनिक प्रयुक्ति।

<u>सुपारिश करा ब्रज्ञे</u> – आरशोला नियन्त्रणेर जन्य

<u>व्यवहारेर निर्देशावली</u> – एई जेल सिस्टेमटि संक्षिप्त ও सहजेई व्यवहार करा याय। कीटनाश्क धारक कार्टारिज्‌टिके विशेषभावे डिज़ाइन करा वेइट गानेर साथे फिट करते हवे, एई गानतिर ट्रिगार टिंपलेई प्रतिवार ठिक *0.03* ग्राम ডোজের *Fipronil* (फिप्रोनिल) জেল বার হবে। আরশোলার প্রজাতি সনাক্ত করা খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তার ভিত্তিতেই জেলের স্পট সাইজ নির্ধারিত হয়। ছোট আকারের জার্মান আরশোলার জন্য উপযোগী স্পট সাইজের ব্যাস ৩ – ৪ মিমি, আবার বড় আকারের আমেরিকান আরশোলার স্পট সাইজের ব্যাস হবে ৬ মিমি। স্পট সাইজের পার্থক্য নির্ধারণ করা জরুরি, নয়ত বড় আরশোলার জন্য বেশি পরিমাণ জেল খরচ হবে। আরশোলা কতটা ছড়িয়ে আছে সেটাও জানা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তার ভিত্তিতেই আরশোলা থাকার স্থান, যেমন গর্ত, ফাটল ও অন্যান্য স্থানের সংখ্যা নির্ভর করে। সুনিয়ন্ত্রণের জন্য, প্রতি বর্গ মিটারে ৩ থেকে ৪টি স্পট দেওয়ার সুপারিশ করা হয়। যে স্থানে প্রয়োগ করা হবে তার আয়তনটি প্রয়োগ উপযোগী স্থানের মোট আয়তন ও মেঝের মোট আয়তনের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়।

<u>सतर्कता</u> – খাবারের থেকে দূরে রাখবেন। এটি প্রয়োগ করার সময় ধূমপান করবেন না বা খাবার খাওয়া বা পানীয় পান করবেন না। যে জামাকাপড় পরে এটি প্রয়োগ করেছিলেন, সেগুলি প্রয়োগের পর বা খাবার খাওয়ার আগে বা পানীয় পান করার আগে ধুয়ে নেবেন, শরীরের উন্মুক্ত অংশও ধুয়ে নেবেন।

<u>विषक्रिया लक्षण</u> – প্রধানত অস্বস্তিকর আলস্য, পেশীতে কাঁপুনি হয় এবং চরম ক্ষেত্রে খিঁচুনি হতে পারে। *Fipronil* (ফিপ্রোনিল) হল একটি বিপরীতমুখী *GABA* রিসেপ্টর ইনহিবিটর এবং এই লক্ষণগুলি জেল থেকে দূরে চলে যাওয়ার পর চলে যায়।

<u>प्राथमिक चिकित्सा</u> – মুখে চলে গেলে গলায় আঙুল দিয়ে বমি করুন। প্রচুর পরিমাণ ঠাণ্ডা জল দিয়ে চোখ ধুয়ে ফেলুন। সাবান ও প্রচুর পরিমাণ জল দিয়ে ত্বক ধুয়ে ফেলুন। ডেয়াজনে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

<u>प्रतिषेधक</u>– কোনও নির্দিষ্ট প্রতিষেধক নেই। লক্ষণ অনুসারে চিকিৎসা করান।

<u>व्यवहृत पात्रेर निष्पत्ति</u> – খালি কার্টারিজগুলি দুমড়ে মুচড়ে কোনও নিরাপদ স্থানে মাটিতে পুঁতে দিতে হবে, যেখান রাখুন সেই স্থান যেন জলের উৎসের কাছাকাছি না হয়। ব্যবহৃত কার্টারিজগুলি এমনভাবে নিষ্পত্তি করতে হবে যাতে জল বা পরিবেশ দূষণ না হয়। ব্যবহৃত কার্টারিজের পুনঃব্যবহার রোধ করার জন্য, সেগুলি উন্মুক্ত স্থানে ফেলা উচিত নয়।

<u>संरक्षणेर उपाय</u> এই ফরমুলেটেড গ্রেড কীটনাশক ধারক কার্টারিজগুলিকে, সেগুলির পরিমাণের কথা বিবেচনা করে মূল পারে কোনও আলাদা ঘরে আলমারিতে তালা চাবি দিয়ে সংরক্ষণ করে রাখতে হবে, এটি শিশুদের নাগালের বাইরে রাখতে হবে, এটি পশু খাদ্য, খাবার ও অন্যান্য সামগ্রীর থেকে দূরে শুষ্ক ও ঠাণ্ডা স্থানে রাখতে হবে। যে স্থানে রাখবেন সেটা যেন বেশ বড় হয়, ভালোভাবে নির্মিত হয়, ভালোভাবে আলোবাতাস পূর্ণ থাকে।

<u>रासायनिक गठन</u> – ফিপ্রোনিল এ.আই *– 0.05% m/m;* মনোবিউটাল ইথার অফ ডাই ইথাইল গ্লাইকল *– 0.50 % m/m* ; ডিনাটোনিয়াম বেনোজেয়েট *– 0.005 % m/m* আর্দ্রতার পরিমাণ *– 17.00 % m/m;* ফ্রুকটোজ *– QS % m/m*

<u>प्रस्तुतकारक ; प्लॉट नं</u>: *51-B,GIDC,*ফেজ-1,ভাপি-*396195,* জেলা-ভালসাদ

.கோக்ரான் சூப்பர்ஜெல்
ஃபிப்ரோனில் 0.0டு% ஜெல் (வீட்டுபயோக பூச்சிக்கொல்லி)

ஃபிப்ரோனில் 0.0டு% ஜெல் என்பது, அமெரிக்க கரப்பான் பூச்சி (பெரிபிளானெட்டா அமெரிக்கானா) மற்றும் ஜெர்மன் கரப்பான் பூச்சியை (பிளாட்டெல்லா ஜெர்மானிகா) கட்டுப்படுத்துவதற்கான ஒரு வீட்டுபயோக பூச்சிக்கொல்லியாகும். இதனைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு குறைந்த அளவே இரசாயனம் தேவைப்படுகிறது. இந்த ஜெல்லானது எவ்வித இடையூறையோ அல்லது அசௌகரியத்தையோ ஏற்படுத்தாது என்பதால் இதன் பயன்பாடு விரைவானதும், வசதியானதுமாகும் மற்றும் இதனை பயன்படுத்தும்போதோ அல்லது அதற்குப் பிறகோ, அந்த இடத்தை விட்டு அகன்று செல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இது செயல்திறன் மிக்கது, பாதுகாப்பானது மற்றும் கரப்பான் பூச்சியைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான மிகவும் நவீன தொழில்நுட்பமாகும்.

பரிந்துரை– கரப்பான் பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்துவதற்கு

பயன்பாட்டு முறை- இந்த ஜெல் அமைப்பு கச்சிதமானதும், பயன்படுத்துவதற்கு எளிதானதுமாகும். பூச்சிக்கொல்லி உள்ள குப்பியானது இதற்கென சிறப்பாக வடிவமைக்கப்பட்ட தூண்டில் செலுத்தியில் பொருத்தப்பட வேண்டும், இது துல்லியமான மருந்தளவை எளிதாக்குகிறது மற்றும் ஒவ்வொரு செலுத்தலிலும் 0.0௩ கிராம் ஃபிப்ரானில் ஜெல் வெளியிடப்படுகிறது. கரப்பான்பூச்சி இனத்தை அடையாளம் காண்பது அவசியமாகும் ஏனெனில் இது ஜெல்லின் துளி அளவை தீர்மானிக்கிறது. சிறிய அளவிலான ஜெர்மன் கரப்பான்பூச்சிக்கு, ௩ – ௪ மிமீ விட்டமுள்ள துளி அளவு உகந்ததாகும் மற்றும் பெரிய அளவிலான அமெரிக்கன் கரப்பான்பூச்சிகளுக்கு, அதன் துளி அளவு ௬ மி.மீ. விட்டம் இருக்க வேண்டும். பெரிய அளவிலான கரப்பான் பூச்சிகளின் அதிக அளவிலான நுகர்விற்கு, துளி அளவில் உள்ள வித்தியாசம் தேவையானதாகும். கரப்பான் பூச்சிகள் எந்த அளவுக்கு மொய்க்கின்றன என்பதை அறிவது மிக அவசியமாகும் ஏனெனில் இது விரிசல் மற்றும் பிளவுகள் மற்றும் கரப்பான் பூச்சிகளின் பிற பொதுவான அடைக்கலம் புகும் இடங்களில் பயன்படுத்தப்பட வேண்டிய துளிகளின் எண்ணிக்கையை பாதிக்கிறது. சிறந்த கட்டுப்பாட்டிற்கு ஒரு சதுர மீட்டருக்கு ௩-லிருந்து ௪ துளிகள் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. மருந்து பயன்படுத்தப்படுகிற இடத்தின் மேற்பரப்பு அடிப்படையில் அது பயன்படுத்தப்பட வேண்டிய பரப்பு கணக்கிடப்பட வேண்டும் தளப்பரப்பின் அடிப்படையில் அல்ல.

முன்னெச்சரிக்கைகள் - உணவுப் பொருட்களிலிருந்து தள்ளி வைக்கவும். இதனைப் பயன்படுத்தும்போது, புகைப்பிடிக்கவோ, சாப்பிடவோ அல்லது குடிக்கவோ கூடாது. இந்தப் பூச்சிமருந்தை பயன்படுத்திய பிறகு, சாப்பிடுவதற்கு, குடிப்பதற்கு முன்பு, மாசுபட்ட உடல் / துணிகளை கழுவி சுத்தம் செய்யவும்.

விஷமாதலின் அறிகுறிகள் - முக்கியமாக எரிச்சல், சோம்பல் மற்றும் தசை நடுக்கம் ஏற்படுகிறது மற்றும் ஜீவிர நேர்வுகளில், வலிப்பு ஏற்படலாம். ஃபிப்ரோனில் என்பது ஒரு மீளக்கூடிய காபா ஏற்பி தடுப்பானாகும் மற்றும் இந்த அறிகுறிகள் வெளிப்பாடு நிறுத்தப்பட்ட பிறகு மீளக்கூடியதாக இருக்கும்.

முதலுதவி - இதனை விழுங்கிவிட்டால், தொண்டையின் பின்பகுதியில் விரலால் தட்டுவதன் மூலம் வாந்தியெடுக்கத் தூண்டவும். நிறையை குளிர்ந்த நீரை ஊற்றி கண்களை கழுவவும். நிறையை சோப்பு மற்றும் தண்ணீரைக் கொண்டு தோலைக் கழுவவும். மருத்துவரை அணுகவும்.

மாற்று மருந்து - குறிப்பிட்ட மாற்று மருந்து எதுவும் இல்லை. அறிகுறிகளைப் பொறுத்து சிகிக்சை அளிக்கவும்.

பயன்படுத்தப்பட்ட கொள்கலனை அகற்றுதல் காலி குப்பிகளை, நசுக்கி, நீர்நிலைகள் மற்றும் வசிப்பிடங்களிலிருந்து தள்ளி, ஒரு பாதுகாப்பான இடத்தில் மண்ணில் புதைப்பதன் மூலம் அழித்துவிடவும். பயன்படுத்தப்பட்ட குப்பிகள், நீர் அல்லது சுற்றுச்சூழல் மாசு ஏற்படாத வகையில் அழிக்கப்பட வேண்டும். பயன்படுத்தப்பட்ட குப்பிகள், அதனை மீண்டும் பயன்படுத்தும் வகையில் வெளியில் எறியப்படக்கூடாது.

சேமித்து வைப்பதற்கான நிபந்தனைகள் வகைப்படுத்தப்பட்ட தர பூச்சிக்கொல்லிகளைக் கொண்ட குப்பிகளானது, குழந்தைகள், உணவுப் பொருட்கள், விலங்குகளுக்கான உணவுகள் மற்றும் பிற பொருட்களுக்கு அப்பால், குளிர்ந்த மற்றும் உலர்ந்த இடத்தில், அதன் அசல் கொள்கலனில், அவற்றின் அளவைப் பொறுத்து பூட்டும் வசதியுடன் கூடிய ஒரு தனி அறை அல்லது அலமாரியில் சேமித்து வைக்கப்பட வேண்டும். சேமித்து வைக்கப்படும் இடமானது நன்கு கட்டப்பட்டு, நல்ல வெளிச்சத்துடனும், போதுமான பரிமாணங்களுடனும் மற்றும் நன்கு காற்றோட்டமாகவும் இருக்க வேண்டும்.

இரசாயன கலவை ஃபிப்ரோனில் a . i - 0 . 0 டு % m / m ; டை-எத்திலீன் கிளைகாலிலுடைய மோனோபியூட்டைல் ஈத்தர் - 0.டு0 % m/m; டெனாடோனியம் பென்ஸோனேட் - 0.00டு % m/m ஈரப்பதம்- கள.00 % m/m; ஃப்ரக்டோஸ் - QS % m/m

தயாரிப்பாளர்; பிளாட் எண்.டுக-B,GIDC,ஃபேஸ்-க,வாபி-௩.கூகூகூகூடு, வால்சாட்

ফিপ্রোনিল **0.05%** জেল
(গৃহ ক্রিমিসংহারক)

ফিপ্রোনিল **0.05 %** জেল একটি ঐ গৃহ ক্রিমি সংহারক, ইদি এক্সুবগা অমেরিকন্ বীদ্ধিংকলেন (পেরিপ্লানেটা অমেরিকানা) মরিযা জর্মন বীদ্ধিংকলেন (ব্লাটেল্লা জর্ম্মানিকা)কে কোঁসং বাডেতারু. বীটিনী অদুযু বেযটানিকে অতী তক্সুব শাতং রসাযনবো অবসরং পডেতাযু। জেল্ বাডকং অনেদি ত্বরগা সোকর্য্যবংতংগ উংটুংদি, ইদি এলাংটী অসোকর্য্যং লেদা ইব্রুংদুলনু কলিগিংচদু অলাগে ইদি পেল্লিংটপ্পুডু পরিসরালনু বদিলি বেল্লে অবসরং উংদদু. ইদি বীদ্ধিংকলনু অদুযু বেযটানিকে চালা প্রভাবংতমৈন, সুরক্ষিতমৈন অত্যাধুনিক পদ্ধতি.

<u>বাডে পদ্ধতি</u> - জেল্ সিস্তং বাডটানিকে চালা সোকর্য্যবংতংগা উংটুংদি. কীটরিদ্ধি টীপ্ নুংদি ক্যাপ্ তীসিনি লোপল নুংদি দ্বারা নেরুগা জেল্লু পেল্লবচ্চু. কোননু অংচুকী আনিংচি নোক্কি পট্টী রংদ্রং দ্বারা জেল্লু এরগা পেল্লবচ্চু. জেল্ চুক্কলু চুক্কলুগা লেদা বরুংগা লেনু লাগা নেত্রুলু লেদা বীদ্ধিংকলু এক্সুবগা তীরিগী চীট লেদা দাগী উংডে চীট লেদা সংপর্কং চেসি চীট পেল্লালী. প্রভাবংতমৈন পনি কোঁসং চদরপু সেংটীমীটরু প্রাংতংলো 3-4 মিমীল ব্যাসার্ত্তংলো (দাদাপু চুক্কলু 0.03 গ্রা উংডেলো) 3 নুংডি 4 চুক্কলু পেল্লালী. চুক্কল সৈজু 6 মিমীল ব্যাসার্ত্তংলো উংডালী. বীদ্ধিংকলু কনিপিস্তি মল্লী জেল্লু পেল্লংডি. এক্সুবগা কডুংগুতা উংডে চীট জেল্লু পেল্লরাদু. ব্যাসার্ত্তংলো তেডালু অন্নবি পেদ্ধ অমেরিকন্ বীদ্ধিংকলনু এক্সুবগা মৌত্তংলো নাশনং চেযটানিকী চালা অবসরং অবুতাযু. বীদ্ধিংকল সংক্রমণ গুরিংচী তেলুসুকোবটং অন্নদি কূডা বীদ্ধিংকল নাশনানিকী চালা অবসরং. এক্সুবগা প্রভাবংতংগা পনি চেযযটানিকী চদরপু মীটরুকী 3 নুংডি 4 চুক্কলু অবসরং পডতাযু. মংদু অপ্পৈ চেসি প্রাংতালু কোলতলু অনেবী মংদু পেল্ছি চীটলনু বট্টী কানী নেল ব্যাসার্ত্তং অদ্দরংগা চেযরাদু.

<u>পেল্লিংটপ্পুডু তীসুকোবল্সিন বাগুংতলু</u> - আহার পদার্থালকু দূরংগা উংচালী. মংদু পেল্লিংটপ্পুডু পোগ তাগটং, তিনটং, তাগটং লেদা চেযরাদু. বট্টলকু লেদা চর্ম্মানিকী অংটীতে কনুক তিনটং তাগটং চেসি মুংদু বাবীনি শুভ্রংগা কডুক্কোবালী.

<u>বিষপু লক্ষণালু</u> - চুরুকুদনং তগ্গিটং, কংডরালু বল্লেংযটং, ইংকা বিপরীত লক্ষণাললো মূর্ছলু কূডা রাবচ্চু. ফিপ্রোনিল্ অনেদি তিপ্পুলৈন GABA রিসেপ্টর্ ইন্হিবিটর্, মংদুনি পূর্ত্তিগা তীসেসিন তরুবাত ঈ লক্ষণালনী মামূলুগা মারুতুংটাযু.

<u>প্রাথমিক চিকিত্স</u> - নোটিল্লপলিকী বেলিনি পেট্টী বলবংতংগা বান্তী চেযুংচালী. মংদু কন্নল্লো পডিনট্টযিতে, চালা এক্সুব মৌত্তংলো মংচি নীটীতো বাগা কডুক্কোবালী. ঒কবেল চর্ম্মানিকী অংটীনট্টযিতে অক্সর্দ সব্সু নীটীতো বাগা কডগালী.

<u>বিরুগুডু</u> - দীনিকী প্রত্যেকমৈন বিরুগুডু অংটুম ঐদী লেদু. লক্ষণালনু বট্টী চিকিত্সনু চেযুংডি.

<u>বাডিন কংটৈনরুনি তীসেসে পদ্ধতি</u> - খাল্লী কীটরিদ্ধুনু মুক্কলু চেসি আবসালকু দূরংগা পাতী পেট্টালী. বাডিন কীটরিদ্ধুলনু বযট পেট্টটং অলাগে তীরিগী বাডটং চেযরাদু. বাডেসিন কীটরিদ্ধুলনু নীরু পর্য্যাবরণ কালুষ্যং জরুগনি বিধংগা নাশনং চেসি পারবেযুংলী.

নিল্য পরিস্তীতুলু - ক্রিমিসংহারকালু কল কীটরিদ্ধুলনু ইতর সামানু নিল্য উংচে গদুললো কাকুংডা বিদীগা গদুললো উংচালী, বাটী মোত্তংদু বাডুক বিধানান্নু বট্টী বাটিনী প্রত্যেক অলমারালো উংচী বাটীকী তাল্ল বেসি উংচালী. ক্রিমি সংহারকালনু নিল্য উংচে গদুলু লেদা বসারালু চক্কগা পোডিগা গালী বেলুতুরু দ্বারাল্লংগা বচ্চেলা কট্টুকোবালী, মংচি তেম বাতাবরণং উংডালী.

রসাযন সম্মেళনং - ফিప్రోనిల్ A. I. : 0.05 % m/m ; মাংটুলৈটুল্ ఎథర్ డైఇథిలీ గ్లైకోల్: 0.50 % m/m; డెనాటోనియం బెంజోయేట్ : 0.005 % m/m; తేమ శాతం : 17.00 % m/m ; ఫ్రక్టోజ్ : QS % 100 % m/m

<u>তযারীদারুলু</u> - M/s অল্টিমা সের্চ্, প্লাট নেং 51-B, জিআইডিসি, ফেজ্-1, বাপী-396195,ডিস্ট্রিক্ট-বল্সাদ

कोक्रोन सुपरजेल

फिप्रोनिल ०.०५% जेल (घरगुती कीटकनाशक)

फिप्रोनिल ०.०५ टक्के जेल एक घरगुती कीटकनाशक आहे, ज्याची अमेरिकन झुरळे (पेरिप्लनेटा अमेरिकाना) आणि जर्मन झुरळांवरील (ब्लेटेला जर्मेनिका) नियंत्रणासाठी शिफारस केली जाते. यांच्या नियंत्रणासाठी एकदम कमी प्रमाणात रसायनांची गरज असते. या जेलचा वापर अतिशय जलद आणि सोयीस्कर आहे, कारण यामुळे कोणतीही अडचण किंवा अस्वस्थता जाणवत नाही आणि उपचारादरम्यान किंवा उपचारानंतर परिसर सोडण्याची गरज भासत नाही. हे झुरळांच्या नियंत्रणासाठी अत्यंत परिणामकारक, सुरक्षित आणि अतिशय आधुनिक तंत्रज्ञान आहे.

शिफारस- झुरळांवरील नियंत्रणासाठी

वापरायचे निर्देश- हे जेल सोयीस्कर आणि वापरण्यास सोपे आहे. कीटकनाशक असलेले कार्ट्रिज खास रचलेल्या बेट गनवर बसवले पाहिजे, जे अचूक डोस पुरविते आणि प्रत्येक शॉटला ०.०३ ग्रॅम फिप्रोनिल जेल मुक्त करते. झुरळाची प्रजाती ओळखणे महत्त्वाचे आहे, कारण यामुळे या जेलच्या स्पॉटच्या आकारावर प्रभाव पडतो. लहान आकाराच्या जर्मन झुरळांवर, वापराचा आकार ३-४ मिमी व्यास आदर्श ठरतो आणि मोठ्या आकाराच्या अमेरिकन झुरळांसाठी ६ मिमी व्यास उचित ठरतो. वापराच्या आकारातील फरक जाणून घेणे मोठ्या झुरळांद्वारा जेलच्या अधिक सेवनाच्या दृश्टीने आवश्यक असते. झुरळांच्या सळसळाटाची पातळी जाणून घेणे महत्त्वाचे असते, कारण त्यामुळे तडा आणि भेगा यात वापरायच्या जागांच्या संख्या आणि इतर सामान्य झुरळांच्या राहण्याच्या जागा कळून येतात. चांगल्या नियंत्रणासाठी, ३ ते ४ जागा प्रति वर्ग मीटरची शिफारस केली जाते. उपचार करावयाची जागा त्या जागेच्या पृष्ठभागाच्या आधारावर निश्चित केली पाहिजे आणि फरशीच्या क्षेत्राच्या आधारावर नव्हे.

खबरदारया- उत्पादन खाद्यपदार्थांपासून दूर ठेवा. हे उत्पादन वापरताना धूम्रपान करू नका, काहीही खाऊ नका किंवा पिऊ नका. वापरानंतर आणि खाण्यापूर्वी, शिण्यापूर्वी दूषित झालेले शरीराचे भाग/कपडे साबण आणि पाण्याने धुवा.

विषारीपणाची लक्षणे- यात मुख्यत्वे चिडचिडेपणा येणे, सुस्ती येणे, श्वासूमध्ये आचके येणे आणि आत्यंतिक प्रकरणात आकडी येण्याची शक्यता असते. फिप्रोनिल रिव्हर्सिबल जीव्हीए रिसेप्टर अवरोधक आहे आणि ही लक्षणे संपर्क तूटल्यावर रिव्हर्सिबल असतात.

प्रथमोपचार- पोटात गेल्यास, घशात बोटे घालून उलटी करावयास लावा. डोळ्यांवर थंड पाण्याचा फवारा मारा. भरपूर साबण आणि पाण्याने त्वचा धुवा. वैद्यकीय उपचार घ्या.

उतारा- कोणताही विशेष उतारा नाही. लक्षणांनुसार उपचार करा.

वापरलेल्या डब्यांची विल्हेवाट- रिकामे कार्ट्रिज चिरडून आणि पाण्याची स्रोते आणि वस्त्यांपासून दूर सुरक्षित अशा ठिकाणी गाडून नष्ट करा. वापरलेल्या डब्यांना अशा रीतीने नष्ट केले पाहिजे, जेणेकरून पाणी किंवा पर्यावरणाचे प्रदूषण होणार नाही. वापरलेले डबे त्यांचा पुनर्वापर टाळण्यासाठी बाहेर टाकून देऊन नेटवे.

साठवणुकीची पद्धत- सूक्रीकरण दर्जेचे कीटकनाशक असलेले कार्ट्रिज कीटकनाशकाच्या प्रमाणानुसार, मूलांचा आवाका, खाद्यपदार्थ, पशु खाद्य आणि इतर वस्तूंपासून दूर वेगळ्या खोलीत किंवा कुलुपबंद अवस्थेत कपाटात मूळ डब्यात आणि थंड आणि कोरड्या ठिकाणी साठवून ठेवा. साठवणुकीची जागा मजबूत, प्रकाशमान, प्रदेश आकारात आणि हवेशीर असली पाहिजे.

रासायनिक संयोजन- फिप्रोनिल ए.आय. – ०.०५% व/व; डायइथिलीन ग्लायकॉलचे मोनोब्युटाइल इथर – ०.५०% व/व; डेनाटोनियम बेन्झोएट – ०.००५% व/व, ओलाच्याचे प्रमाण – ४७.००% व/व; फ्लक्टोज – क्यूएस% व/व

द्वारा उत्पादित: प्लॉट क्र. 51-B, जीआयडीसी, फेज- 1, वापी- 396195, जिल्हा- वलसाड.

कोक्रोज़ सुपरजेल

फिप्रोनिल 0.05% जेल (घरेलू कीटनाशक)

आमेरिकाय असपटा (एरेप्लानेटा आमेरिकाना) एवं जर्मान असपटा (ब्लटेला जर्मानिका) नियंत्रण पाने फिप्रोनिल 0.05% जेल, हेचके एक उपरोक्त कीटनाशक। नियंत्रण हासिल करने पाने अत्यधिक कम् प्रायोग्यिक पदार्थ आवश्यक। जेलेन उपयोग हुए एवं सुविधाजनक, कारण एहा कोसिसी बिघ्न किम्बा अस्वाभविकता सृष्टि करेन नाहीं एवं रविवार सामयिक किम्बा उपरे उस क्षतिकारक कोसिसी आवश्यकता नाहीं। असपटा नियंत्रण पाने एहा अत्यन्त प्रभावशालिन, निरापद एवं सबुठारु आधुनिक प्रयुक्तिबिद्या।

सुपारिश – असपटा नियंत्रण पाने

व्यवहारार निर्देश - जेल सिरिंज क्षोटा(कार्ट्रिज) एवं व्यवहारन करिबा सहज अटे। कीटनाशक धारण करिथ्वा कार्ट्रिज् स्वतन्त्र डिजाइन् होइअ्देवा बाद् बन्दुक (कीटनाशक धारक जेलेन प्रयोग करे एवं ठोजिं पाने एक मिटर बन्दुकरे फिट् हेबा आवश्यक, जाहा सठिक् ठोजिं(मात्र परिमाणर ऊपर्थ देवा)कु सहज करिथाए ও प्रत्येक क्षतरे 0.03 ग्राम फिप्रोनिल् जेल बाहारि थाए। असपटा प्रजातिपुड़िकु चिन्हिबा जरूरी कारण एहा जेलेर स्वट् आकारकु प्रभावित करिथाए। क्षोट आकारर जर्मान असपटा पाने, 3-4 मिमि व्यास रेखिष्ट स्वट् आकारे सर्थारक अटे एवं वृहत आमेरिकेयर असपटा मानङ्क पाने स्वट् आकारे 6 मिमि व्यास हेबा उचित। वृहत असपटा द्वारा जेलेर अधिक सेवनर पाने स्वट् आकारेर पार्थक्य आवश्यक। असपटा सांघुमाक्षेर स्तर जानिबा अत्यन्त गुरुत्वपूर्ण कारण एहा फाट, खाल एवं अन्यान्य साधारण असपटा आश्रयस्थलेर प्रयोग हेबार्कु थ्वा स्वट् संख्यार्कु प्रभावित करिथाए। एक जेल नियंत्रण पाने प्रति वर्ग मिटरेर 3 ও 4 स्वट् सुपारिश करायाए। औषधेर उपयोग हेबार्कु थ्वा क्षेत्रकु उपयोग करायाऊथ्वा साबरेर ब्रुपयुक्त क्षेत्रु आधारेर गणना करायिबा उचित एवं ठाचाक क्षेत्रु आधारेरे नव्हे.

सतर्कता – खाद्य सामग्रीरुकु दूरेरे राखिबु। व्यवहारार करिबा समयरेर धूम्रपान करऊ नाहीं, खाथाकु नाहीं किम्बा पिअऊ नाहीं। व्यवहारार परेर एवं खाइबा पूर्वरु, दूषित शरीरार / पोशाकर धोइल दिअन्तु।

विष्ठार लक्षण - गुप्तभाव दिरुद्धिकर निदुआ अवस्था, मांसपेशी कम्पन एवं चरम पराक्षिप्तिरेर सावधतां अनिच्छाकृत मांसपेशी संकोचन याहा अनियंत्रित कम्पन एवं अङ्ग छटि घटाइआयाए। फिप्रोनिल् हेचके एक ऊलटा गाबा रिसेप्टर प्रतिरक्षक एवं प्रभाव समाप्त हेबा परेर एहि लक्षणसुड़िक ऊलटा होइआथ।

प्राथमिक चिकित्सा - यदि गिलिदेलेल,तेबेर आङ्कुठि सहित गलार पछ भाररेर टिन् करि वाहि कर। पुरुर थंडा पानीरेर आश्रुकु सफा करन्तु। चर्मकु पुरुर साबुन एवं पानीरेर धोइ दिअन्तु। डाक्तरा चिकित्सा कर।

प्रतिकार - कोनसि निर्दिष्ट प्रतिकार नाहीं। लक्षणानुक चिकित्सा दिअ।

उतारा- कोणताही विशेष उतारा नाहीं. लक्षणांनुसार उपचार करा.

वापरलेल्या डब्यांची विल्हेवाट- रिकामे कार्ट्रिज चिरडून आणि पाण्याची स्रोते आणि वस्त्यांपासून दूर सुरक्षित अशा ठिकाणी गाडून नष्ट करा. वापरलेल्या डब्यांना अशा रीतीने नष्ट केले पाहिजे, जेणेकरून पाणी किंवा पर्यावरणाचे प्रदूषण होणार नाही. वापरलेले डबे त्यांचा पुनर्वापर टाळण्यासाठी बाहेर टाकून देऊन नेटवे.

साठवणुकीची पद्धत- सूक्रीकरण दर्जेचे कीटकनाशक असलेले कार्ट्रिज कीटकनाशकाच्या प्रमाणानुसार, मूलांचा आवाका, खाद्यपदार्थ, पशु खाद्य आणि इतर वस्तूंपासून दूर वेगळ्या खोलीत किंवा कुलुपबंद अवस्थेत कपाटात मूळ डब्यात आणि थंड आणि कोरड्या ठिकाणी साठवून ठेवा. साठवणुकीची जागा मजबूत, प्रकाशमान, प्रदेश आकारात आणि हवेशीर असली पाहिजे.

रासायनिक संयोजन- फिप्रोनिल ए.आय. – ०.०५% व/व; डायइथिलीन ग्लायकॉलचे मोनोब्युटाइल इथर – ०.५०% व/व; डेनाटोनियम बेन्झोएट – ०.००५% व/व, ओलाच्याचे प्रमाण – ४७.००% व/व; फ्रक्टोज – क्यूएस% व/व

द्वारा उत्पादित: प्लॉट क्र. 51-B, जीआयडीसी, फेज- 1, वापी- 396195, जिल्हा- वलसाड.

केकरोन सुपरजैल

फिपरोनिल 0.05 % जैल (घरेलू कीटनाशक)

फिपरोनिल 0.05 % जैल एक घरेलू कीटनाशक है जो अमरीकी कारवेच (पेरीप्लैनेटा अमेरीकाना) और जरमन कारवेच (ब्लैटेला जरमनिका) 'ते निर्धारुट पाइँते लही सिफारश कीती जांदी है। निर्धरतट पूपत्र करन लही तमारिट ते बहुत थॅट मात्रा दी लेऊ हुंदी है। जैल दी वरतॅ ते उत्त अते सुविधाजनक हुंदी है, किउँकि इस नाल केरी परेशानी नां हेअरनी पेश नहीं आउँदी अते इस दुआरा हिसाब करन दे दौरान नां ग़ायद दिंच हुँम इमारत हुँ हॅडट दी केरी लेऊ नहीं हुंदी है जिस दिंच इस हुँ वरतिआ गिआ है। इए कारवेचां 'ते निर्धरुट लही बहुत पृक्षरमाली, सुरॅचिअत अते सत ते आधुनिक तकनीक है।

सिफारश-कारवेचां 'ते निर्धरतट लही

वरतॅ दे निरदेश - जैल सिमटम संधेप अते वरतॅ दिंच आसान है। कीटनाशक वाले कारटरेज हुँ विशेश तौर 'ते डिआइ कीती गाही बेट गन दिंच फिट कीता जाना है, जे सटीक धुंरान निकलट दी सहूलत प्रदान करदा है अते हर शाट दे नाल 0.03 ग्राम फिपरोनिल जैल जारी हुंदा है। कारवेच दी प्रजातीआं दी पछाट करना बहुत ही महॅत्वपूरन है किउँकि इए किसे सबान 'ते जैल लगाए जाए ते आकार दे पुझारट करदा है। छेटे आकार दे जरमन कारवेच लही, जैल लगाए जाए दा आकार 3-4 मिलीमीटर दे दिआम दिंच आदरश है अते वॅडे अमरीकी कारवेचां लही जैल लगाए जाए दा आकार 6 मिलीमीटर दिआम दिंच ठेहा चाहीदा है। वॅडे कारवेचां दुआरा जैल दी वॅधा धपड़ कीते लही सपट सप्रीज़ दिंच इए अंतर ठेहा बहुत ज़रूरी है। कारवेच दुआरा कीते गाऐ संवरमट दे पॅधर हुँ जाहरा वी बहुत महॅत्वपूरन है किउँकि इए दरारां अते तरेड़ां अते कारवेच दे वॅम जाए दे ठेर सबान दिंच जैल हुँ लगाऐ जाए दी सॅधिआ 'ते असर पाईंदा है। चंगे निर्धरतट लही पूरी वरगा मीटर 'ते 3-4 सबान दे जैल लगाऐ जाए दी सिफारश कीती जांदी है। इलाज कीते जाए वाले थेतर दी ताटना कीती जा तही सादीद दे सतह थेतर दे आधार 'ते कीती जाणी चाहीदी है ना कि वरतश थेतर दे आधार 'ते।

सावधानीआं – इस हुँ थाए पीते वालीआं चीज़ां ते दूर रॅधे। इस हुँ वरतदे समें सिगरटनोशी ना करे नां वुझ खाए नां पीईं ना। दूसित सरीर/कॅपड़िआं हुँ इस दी वरतॅ ते धाअद अते थाए-पीए ते पहिलां धेवे।

सरिर चहुट दे लॅछट - मॅथ तौर 'ते चिड़चिड़ापन, सुसती, भासपेशीआं दा कॅबत अते बहुत ज़ंबीर मामलिआं दिंच संभावत तौर 'ते कज़वॅल पेदा हो सकदे ठन। हिपरेनिल इंक पराटरघेत GABA रीसैपटर इनिहिबटर है अते इए लॅछट संपरक वत्त आउँदे ही समापती ते धाअद पतड़ जांदे ठन।

परिहली सहाएता (हमट ऐड)- जेकर निगल लिआ गिआ होवे तां ऊँगली नाल गले दे पिछले पासे ब्रॅतबुत्तरीआं वरत करके ऊलटी करवाउँदे दी केसीश करो। बहुत सारे ठंडे पानी नाल अॅखां हुँ सा़ड करो। बहुत सारे साबट अते पानी नाल तवॅचा हुँ धोवे। मेडीकल सहाएता प्रापत करो।

सरिरमार - केदी धास सरिरमार (ऐंटीडेट) नहीं है। लॅछट अधारत हिआन दिऊ।

वरतॅ वाऐ कंटैनर दा निपटारा - पानी दे सरोतां अते वसतीआं ते दूर किसे सुरॅचिअत सथान 'ते मिटी दिंच कुचल के अते दॅबे के थली कारटरेज हुँ नसट करद दिऊ। वरतॅ होऐ कारटरेज हुँ इस तरीके नाल नसट करना चाहीदा है तां जे पानी नां वातावरट दिंच धूदूसट ना होवे। हिसदी मुंद वरतॅ हुँ तेकट लही वरतॅ होऐ कारटरेज हुँ बाहर नहीं ॅहॅडट चाहीदा है। वयॅकरयूटॅ.

ड्डॅडार वरतन दीआं सथितिआं

मुत्तरीवरतन गॅझ वाले कीटनाशकां वाले कारटरेज नै कीटनाशक दी मात्रा दे आधार 'ते इॅक दॅघरे कमरे नां ज़ोरबॉद भलमारी दिंच, घॅंचिआं दी पट्टिं, ड्रेनज पदारतां, पशूआं दे चारे अते वेह समान ते दूर इसदे अमल ड्डॅथे दिंच ठॅडी अते सूॅकी जग्गा 'ते सटेव कीता जाना चाहीदा है। सटेरेज लही जग्गा चॅगी तरां बटी, चॅगी रेशनी वाली, भाप दिंच काफ़ी अते चॅगी तरां हवादार होटी चाहीदी है।

ग़मारिट्टेव तंत्रन: हिपरेनिल ऐ.आई. - 0.05% m/m; ड्राइथाएीलीन गलाएीकॅल दा मोनेबिट्टिल ईथर - 0.50 % m/m; डैनाटेनियम बैंजेऐट - 0.005 % m/m, नमी दी समॅगरी - 17.00 % m/m; ढ़तुकटेज़ - QS % m/m

दुआरा निरमित: पलाट नैबर 51-बी, जीआएडीडीसी, ढ़ेज़-1, वप्पी-396195, ज़िल्ला-वलसाड

कोक्रोज़ सुपरजेल

फिप्रोनिल 0.05% जेल (गार्हनिक कीटनाशीनी)

फिप्रोनीलो 0.05 % जेल्ले ओरु गार्हनिक कीटनाशीनीयाऽनों अमेरीकेक्कन पाटू (पेरीप्लानेटू अमेरिकेना) अनेऽ जर्मन पाटू (ब्लाटेल्ला जर्मेनीका) एन्नीयवुडे नियंत्रणत्तीनायाऽनों इत्तु शुपारऽश चेय्युन्नतऽ. नियंत्रणमु केऽडुन्नतीनुं वळरुवे कुऱवत्तु अल्पवीळुल्ल रासवसंपत्तुक्कळ् आवश्यमाऽनं. जेल्ले प्रयोजनम वेगत्तवेगीयुमु ऽपयोगक्कुवानुमानं, कारणम इत्तु अस्वस्थतयोऽ ब्युद्धीमुट्टुकळेऽ उण्टाऽक्कुन्निल्ल, कूडऽतेत्तु चिकित्सयऽक्कीडेयोऽ अतीनुमुशेषमेऽ नियंत्रणम कडत्तु के शेषंऽ नां ग़ायद्दिं दिंच ऽप्रिम इमारत हुँ हॅडट दी केरी लेऊ नहीं हुंदी है जिस दिंच इस हुँ वरतिआ गिआ है। इए कारवेचां 'ते निर्धरुट लही बहुत पृक्षरमाली, सुरॅचिअत अते सत ते आधुनिक तकनीक है।

शुपारऽश - पाटुकळ्ळे नियंत्रीक्कुन्नतीनुं

ऽपयोगम निर्दशेशुंगळ्: जेल्ले सिरिञ्ञ ओतुञ्ञीयतुं ऽपयोगीक्कानं एळुप्पुवुमाऽनं. कीटनाऽशीनी अऽञ्ञीय काऽट्रीऽज़् प्रत्येऽकं रूपऽक्कल्पन चेय्यप्पेट्ट गन्नुंगळिल् ऽघटिप्पिक्कंनं, इत्तु कृत्यमाय ऽडोसीऽगं सुऽगमऽमाक्क्कुकयुं ओरोऽ ऽषोट्टीलुंमु 0.03 ग्रॅऽ ऽप्रिप्रोनील् ऽजेल् पुऱत्तेत्तुवीऽऽकयुं चेय्युन्नुमु. ऽजेल्लिनॅऽ स्पॅऽपोऽट्टु वलुप्पत्तिल् स्याऽधीनमुळ्ळतु एन्नतीनाऽल् पाटुकळुडेऽ इनंऽ तीरिच्चरियेण्डतु प्रधानमाऽनं. चेऽरियऽ वलिप्पमुळ्ळऽ ऽइमॅऽमॅऽ पाटुकळ्क्कॅऽ, 3-4 मिल्लीमीटुरॅऽ व्यासमुळ्ळऽ स्पॅऽपोऽट्टु ऽसैऽसॅऽ अनुयोऽज्यमाऽनं, वलियऽ अमेरीक्कॅऽ पाटुकळ्क्कॅऽ स्पॅऽपोऽट्टु वलुप्पुऽ 6 मिल्लीमीटुरॅऽ व्यासमुळ्ळतायिरिक्कंनं. स्पॅऽपोऽट्टु वलुप्पत्तीलुळ्ळ व्यत्ययासं ऽपयोग्यमाऽनं कारणम वलियऽ पाटुकळ्क्कॅऽ कूडुतल् ऽजेल् ऽपयोग्यीक्कॅऽण्डतुण्टॅऽ. पाटुकळुडेऽ आक्रमणत्तीनुंऽ तोत्तॅऽ अरियुन्नतुमु वळरुवे प्रधानमाऽनं, कारणम इत्तॅ वीळुल्लऽलुकळिलुंमु ऽपोऽडुल्लऽलिलुंमु मट्टॅ स्याधारण पाटुकळुडेऽ हार्ऽबऽरोऽङ्गऽकळिलुंमु कीऽटनाऽशीनी प्रयोऽग्यीक्कॅऽण्ड पाऽडुकळुडेऽ एण्णत्तॅऽ स्याधीनिक्कुन्नुमु. मीकच्च नियंत्रणमॅत्तीनॅ ऒरु चतुरश्र मीट्टरीऽ 3 मुतऽल् 4 वरॅऽ स्थऽलङ्ङळिलीऽ वरॅऽ इत्तॅ ऽपयोऽग्यीक्कॅऽण्ड शुपारऽश चेय्युन्नुमु. मरुमॅऽ प्रयोऽग्यीक्कॅऽण्ड स्थऽलत्तीनॅऽ व्याऽपॅऽ कऽण्क्कऽक्कॅऽण्डतुण्टॅऽ ऽपयोऽगीक्कॅऽण्ड स्थऽलत्तीनॅऽ विऽसॅऽतीऽण्णत्तीनॅऽ अऽडीऽस्थाऽनमत्तीलाऽनं, अल्लाऽतॅ तऽर विऽसॅतीऽण्णत्तीनॅऽ अऽडीऽस्थाऽनमत्तीलल्ल.

मूऽनऽकरुतलुकळ् - भऽक्षणमत्तीलॅऽ निऽन्नॅ अऽकऽन्नु निऽल्क्कुकऽ. ऽपयोऽग्यीक्कुवपोऽळ् पुऽकवलिक्कुकयोऽ भऽक्षणमॅऽ कऽषिक्कुकयोऽ कुऽडिक्कुकयोऽ चेय्युऽरुतॅ. ऽपयोऽग्यत्तीनॅऽ शेऽषवुंमु भऽक्षणमॅऽ कऽषिक्कुन्नतीनुंमु कुऽडिक्कुन्नतीनुंमु मुंमुंमु मलिनमाऽय ऽशरीऽरम्/वऽस्त्रङ्ङळिऽ कऽषुकुकऽ.

विऽषबाऽधयुडेऽ लऽक्षणङ्ङळ् - प्रधानमाऽयुंमु अऽस्यस्थाऽनं, अलसतऽ, पेऽशीकुडेऽ वीऽयऽकॅऽ एन्नीयवुंमु गुऽरुतरमाऽयऽ सन्तरंऽशङ्ङळिलीऽ कॅऽऽच्चीप्पिडुत्तऽवुंमु उण्टाऽकाऽम. ऽफिप्रोऽनील् ऒरु गीवेऽग्ऽसीबिलीऽ G A B A रीसऽप्टॅऽरॅऽ इन्हॅऽबीबीटुरॅऽरान्, सम्परॅक्कऽ फऽलङ्ङळिऽ अवसाऽनीच्चतीनॅऽ शेऽषंमु ई लऽक्षणङ्ङळिऽ इल्लाऽताऽकुन्नुनाऽतान्.

प्रऽपतशऽशुऽश्रूऽषऽ-वीऽशुङ्ङुकऽयाऽण्णॅऽकिल् विऽरलॅऽ कॊऽञ्ञॅऽ तॊऽञ्ञुयुडेऽ पीऽन्नॅऽभाऽगत्तॅऽ ऽसॅऽरॅऽशीऽच्चु ऽहऽरॅऽद्दी ऽवऽरवॅऽण्ड ऽइऽण्टॅऽ उऽऽटॅऽ वऽरवॅऽण्डॅऽ ऽपीऽऽकॅऽण्डॅऽ ऽप्रॅऽरॅऽशीऽकॅऽण्डॅऽ ऽइऽण्ट